

Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1997-1998 à l'automne 1998

Rapport de la Centrale ornithologique valaisanne

par Emmanuel Revaz¹

Bull. Murithienne 117: 73-87

EINLEITUNG

Ornithologische Chronik für das Wallis von Winter 1997-1998 bis Herbst 1998

Ein Alpenschneehuhn, das auf fast 4000 Metern oben seine Spuren hinterliess, eine Skua, die am Genfersee einen Hauch von Meer verbreitete – 2 von fast 6000 Meldungen der Walliser ornithologischen Zentrale, der Centrale ornithologique romande, der Schweizerischen Vogelwarte und des *Réseau Gypaète Valais et Alpes romandes*, die uns erlaubt haben, die vorliegende Chronik zusammenzustellen. Wir hoffen, dass sie die feldornithologischen Ereignisse des Jahres 1998 möglichst wahrheitsgetreu wiedergibt und dass sie sowohl die generellen Tendenzen wie auch die Besonderheiten herauschält.

Ein herzliches Dankeschön geht natürlich sowohl an die treuen wie auch an die neuen Beobachterinnen und Beobachter. Mit ihrer Aktivität im Feld – an einträglichen wie an weniger einträglichen Tagen – und mit ihrer Bereitschaft zum Melden von Brutvögeln, Durchzüglerinnen oder Irrgästen haben sie enorm zu dieser Zusammenstellung beigetragen.

Wir danken hiermit auch Bernard Volet und Hans Schmid (Übersetzung ins Deutsche) von der Schweizerischen Vogelwarte für die enge Zusammenarbeit, Jean-Claude Praz und Anita Praz vom Naturhistorischen Museum Sitten und von der *Murithienne* für ihre wiederum entgegenkommende Flexibilität und Jérôme Fournier für die diese Seiten belebenden Zeichnungen. Schliesslich geht unser herzlicher Dank auch an Bertrand Posse, der das Manuskript durchgesehen und einen kontinuierlichen Informationsfluss ermöglicht hat.



¹ Route de Fully 27, 1920 Martigny

INTRODUCTION

Des traces laissées dans les neiges alpines par le Lagopède à près de 4000 mètres d'altitude, aux ambiances marines traînées à la suite du passage d'un Grand Labbe sur le lac Léman, ce sont près de 6000 données, en provenance des Centrales ornithologiques valaisanne et romande, de la Station ornithologique suisse et du Réseau Gypaète Valais et Alpes romandes, qui nous ont permis de composer la présente chronique; nous espérons que celle-ci reconstitue le plus fidèlement possible la réalité ornithologique associée à l'année 1998 en Valais, et qu'elle en fasse ressortir tant les tendances générales que les originalités.

Un merci donc tout naturel aux fidèles observateurs ainsi qu'aux nouveaux, qui, tant par leur présence sur le terrain – aux jours fastes comme aux jours ingrats –, que par leur disponibilité à signaler leurs observations d'oiseaux nicheurs, migrateurs ou simplement visiteurs perdus, sont pleinement associés à la réalisation de cette synthèse.

Nous exprimons également ici notre plus vive reconnaissance à Bernard Volet et Hans Schmid de la Station ornithologique suisse pour leur solide collaboration, à Jean-Claude Praz et Anita Praz du Musée d'histoire naturelle de Sion et de la Murithienne, dont nous avons une nouvelle fois bénéficié de la bienveillante flexibilité, à Jérôme Fournier pour les dessins qui animent ces pages, à Hans Schmid pour les traductions allemandes. Enfin, nos chaleureux remerciements vont également à Bertrand Posse, pour la relecture du manuscrit et pour l'échange continu d'informations.

Abréviations des noms d'observateurs Abkürzungen der Beobachternamen

A: rA = R. Arlettaz - **B:** mBa = M. Baudraz - **C:** gCa = G. Carron ; yCr = Y. Crettenand - **D:** mD = M. Desfayes; cID = Cl. Dirac; hDu = H. Duperrex ; jDp = J. Duplain - **E:** fE = F. Estoppey - **F:** jFi = J. Fischer; jeF = J. Fournier ; yFr = Y. Frutig - **G:** jmGa = J.-M. Gaillard ; mGe = M. Gerber; Gey = Cl. Geyer; jGr = J. Gremaud ; tGu = T. Guillaume - **H:** jHa = J. Hartmann - **I:** rIm = R. Imstepf - **J:** nJ = N. Jordan ; adJ = A. Jordi; moJ = M. Julien - **K:** cK = Ch. Keim; Ker = P. Kernen - **L:** alU = A. Lugon; rLU = R. Lugon - **M:** paM = P. Marchesi; liM = L. Maumary; bM = B. Michellod - **O:** paO = P.-A. Oggier - **P:** mPe = M. Perraudin; beP = B. Posse; Pra = Ch. Praz - **R:** Rz = J.-P. Reitz ; eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - **S:** Sal = P. Salzgeber; eS = E. Sermet; aSi = A. Sierro; jS = J. Strahm - **T:** mTh = M. Thélin; jCT = J.-Cl. Tièche - **V:** rV = R. Voisin; bV = B. Volet - **W:** phW = Ph. Werner - **Z:** Zur = S. Zurbruggen.

Puis: **CAVs** = Commission de l'avifaune suisse - **div obs** = divers observateurs - **HS** = Haute-Savoie.

AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE:

ad = adulte; **ch** = chanteur; **c** = couple; **f** = femelle; **imm** = immature; **ind** = individu; **juv** = juvénile; **m** = mâle; **max** = maximum; **min** = minimum; **subad** = subadulte; **ssp** = sous-espèce.

L'HIVER 1997/98 WINTER 1997/98

Avec des températures nettement supérieures à la moyenne, et, conséquence directe, une couverture neigeuse en plaine qui fut aussi mince qu'éphémère, les mois de décembre, janvier et février ne posèrent guère de problèmes aux oiseaux séjournant en nos contrées. Ainsi, deux espèces de **PASSEREAUX** purent notamment se distinguer par leur présence hivernale inhabituelle en Valais: le **TARIER PÂTRE** et le **ROITELET À TRIPLE BANDEAU**, observés ponctuellement au cœur de la saison puis en petit nombre dès la première moitié de février. Parmi les hivernants traditionnels, seul le **SERIN** brilla par son absence, qui fut cependant en accord avec la discrétion du fringille marquée dans tout le pays. Une autres espèce, mais de canard cette fois, figure également sur la liste des spécialités de l'hiver valaisan cuvée 97/98: la **NETTE ROUSSE**, dont le séjour prolongé d'un individu constitue sans doute une première pour le canton à pareille saison.

Mit deutlich überdurchschnittlichen Temperaturen und – als direkte Folge davon – einer Schneedecke, die in den Niederungen ebenso dünn wie vergänglich war, stellten Dezember, Januar und Februar die in unserer Gegend ausharrenden Vögeln kaum vor grössere Probleme. So zeigten sich denn auch zwei Arten, die sonst im Winter nur selten im Wallis auftreten: **SCHWARZ-KEHLCHEN** und **SOMMERGOLDHÄHNCHEN**. Sie wurden punktuell mitten im Winter und dann in kleiner Zahl Anfang Februar gesichtet. Unter den traditionellen Wintergästen glänzte nur der **GIRLITZ** mit Abwesenheit; dieser Finkenvogel war im ganzen Land sehr spärlich. Mit der **KOLBENENTE** sorgte auch eine Entenart für einen Eintrag in die Spezialitäten-Liste dieses Walliser Jahrganges: Ihr langer Winter-Aufenthalt bedeutete für unseren Kanton zweifelsohne eine Premiere.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Hivernage de 2 à 6 ind à Grône, observés du 24.12 au 3.3 (N. Erard, Rey, C.&O. Roy). Ailleurs, 2 ind à Sierre les 13 et 24.2 (Rey).

CORMORAN, KORMORAN

Très faible présence dans le fief hivernal habituel de Granges: seulement 1 à 8 ind, dont on ne retrouve plus de trace à partir du 8.1 déjà (Rey, aSi). Les tirs au dortoir signalés par aSi à fin décembre seraient-ils à l'origine de cette désertion? Ailleurs, 1 ind le 6.12 à Baltschieder (Ker), 1 le 2.1 à Ausserberg et Raron (W. Jorns; Ker), et 1 le 17.1 à Dorénaz (jeF).

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Des hivernants sont signalés à Grône, où les effectifs maximaux sont notés à fin décembre – début janvier (17 ind le 24.12, 15 le 1.1; Rey), Sierre, St-Léonard (Rey), Dorénaz (beP, eRe), St-Maurice (eRe). A relever un ind le 8.2 à Bagnes, 800 m (eRe), seule mention hors plaine du Rhône.

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Mis à part les attroupements habituels du Chablais à Vouvy et Collombey-Muraz (rV), un ind séjourne sur le Rhône de St-Maurice entre le 29.1 et le 11.2 au moins (Rz).



SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Une seule mention en décembre, le 9, à Sierre (Rey), puis une seule en janvier, le 8, à Grône (12 ind, Rey). En février, 15 à 30 ind séjournent à Sierre du 3 au 20.2 (Rey, aSi); le site est ensuite déserté au profit de Grône, où les eaux redevenues liquides accueillent 17 ind le 21.2 (N. Erard).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

Effectifs hivernants concentrés en 2 sites: Gérone/Sierre, où l'on note entre 50 et 100 ind du 21.12 (beP) au 28.2 (Rey), et Granges/Sierre, qui accueille un max de 200 ind le 10.2 (aSi). Comme pour l'espèce précédente, la dernière mention pour Grône date du 8.1 (50 ind; Rey); les canards abandonnent ensuite le site pour cause de gel des eaux, et ne le retrouvent que le 20.2 (32 ind; Rey); le 24.2, ils sont déjà une centaine (Rey), alors que – principe des vases communicants oblige – l'effectif de Granges/Sierre passe de 100 ind le 19.2 à 10 ind le 24.2 (Rey).

NETTE ROUSSE, KOLBENETE

Premier cas documenté d'hivernage de l'espèce en Valais: le m présent à Sierre depuis le 14.10 (cf dernière chronique) y est mentionné jusqu'au 9.2 (Rey).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

Peut-être un hivernage complet d'un m à Sierre, vu le 12.1, le 21.2 et le 28.2 (Rey).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

Un m le 9.1 à Gérone/Sierre (beP), ne sera plus revu par la suite.

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Apparition d'un ind le 14.12 au Bouveret (O. Epars).

GYPAÈTE, BARTGEIER

Républic 9 (HS 1996) à Aven/Conthey jusqu'au 30.1 (rA) et Trubel à Leukerbad sont les 2 "valeurs sûres" de l'hiver. Sinon, observations ponctuelles d'un ind le 3.1 sur Dorénaz (jmGa) et d'un subad le 16.1 sur Vérossaz (A. Marclay).

BUSARD ST-MARTIN, KORNWEIHE

Hivernants traditionnels du Chablais: oiseaux observés à Port-Valais (G. Gilliéron), Vouvry (liM, eS, rV), Vionnaz (eS, rV) et Collombey-Muraz (eS).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Aucune mention hivernale.

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

Seuls indices de présence à basse altitude, des crottes fraîches trouvées le 17.1 à Ayent, 850 m (aSi). Sinon, relevons 4 ind le 29.12 sur Evolène, 2400 m (mTh), et 6 à la même altitude, également sur Evolène, le 18.2 (jcT).

RÂLE D'EAU, WASSERLALLE

Les cris entendus à Sierre le 19.2 (Rey) et Grône le 21.2 (paM) sont peut-être émis par des premiers arrivants. Aucune donnée plus tôt dans la saison.

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

Présence de 2 ind sur le Rhône de Collonges les 7 et 27.12 (eRe; beP), d'un ind à Grône le 24.12 (Rey), de 1 à 6 ind à Sierre entre le 27.12 et le 21.2 (Rey) ainsi que de 4 ind le 8.2 à Martigny (beP).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Apparition de 2 ind le 5.1 à Vouvry (rV).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

3 observations ponctuelles: 3 ind le 23.1 à St-Léonard (C.&O. Roy), 2 le 29.1 au Bouveret (yCr) et une le 23.2 à Vionnaz (nJ).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

2 données qui traduisent des tentatives d'hivernage: une le 20.1 dans une vigne enneigée à Flanthey (N. Udriot) et une le 4.2 à Conthey (beP).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Un le 26.11 à Monthey (rV), ne sera plus noté par la suite. En janvier, un ind "perdu" le 24 à Raron (Ker).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

rV compte 61 ind le 7.12 à Illarsaz; bien plus loin du lac, 1 ind le 16.12 à Sierre (Rey).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

Un le 28.1 à Sierre (Rey).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

A relever 3 ind en vol amont le 31.1 à St-Maurice (Rz).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Indices d'hivernage à Grône (aSi), Conthey (yCr) et Martigny (paM).

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDIERCHE

Dans le Chablais uniquement, avec un max d'une centaine d'ind le 23.1 dans les champs enneigés de Vouvry (eS).

PIPIP FARLOUSE, WIESENPIEPER

7 mentions hivernales dispersées entre St-Maurice (15 ind le 26.12; eRe) et Baltschieder (21 ind le 2.1; Ker).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Très discrète; isolées les 6 et 21.12 à Baltschieder, 2 le 21.12 à Eggerberg (Ker) et 2 le 1.1 à St-Léonard, où l'espèce est encore signalée le 30.1 (Rey).

CINCLE, WASSERAMSEL

13 ind comptés le 25.2 sur le tronçon du Rhône reliant Oberwald à Ulrichen (P. Blaser).

ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE

8 mentions totalisant 10 ind, en provenance de la plaine et du pied du coteau, à Vionnaz, St-Maurice, Martigny, Fully, Sion et St-Léonard.

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Jamais vu en plaine, et seulement à 4 reprises en dessous de 1000 m: 10 ind le 4.12 à St-Léonard, 900 m (aSi), un le 24.12 à Martigny-Combe, 730 m (beP, eRe), cris le 9.1 à Chamoson, 650 m (beP) et 3 ind le 10.2 à Leuk, 700 m (liM). A l'opposé, 6 ind fidèles aux hauteurs le 9.1 sur Zermatt, 3000 m (jcT) et un le 6.2 au Mont-Fort/Bagnes, 3300 m (P. Albrecht).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

Absence totale entre les mois de décembre et janvier. En février, un le 4 à Massongex (rV), un ch bien précoce le 8.2 à Lens et 10 ind, dont 3 ch, le 14.2 à Chamoson, 1000 m (aSi); ces données concernent probablement des premiers arrivants très hâtifs.

PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Un ind vu une fois le 21.12 à Visp (Ker). En février, 3 ind à Martigny le 8.2, dont 2 sont revus les 12, 19 et 21.2 (beP, eRe), ainsi qu'un ind le 9 à Leuk (rA) et que 3 ind le 10 entre Collonges et Dorénaz, dont 2 sont revus le 26 (eRe); cette présence remarquée durant la fin de l'hiver est un signe, sinon d'hivernages réussis, du moins de retours extrêmement précoces.

MERLE NOIR, AMSEL

Chante au cœur de l'hiver, le 19.12 et le 5.1 à Martigny (beP).

GRIVE LITORNE, WACHOLDERDROSSEL

Rassemblement habituel à Ardon, où 300 ind sont comptés le 28.12 (beP).

GRIVE MUSICIENNE, SINGDROSSEL

Une seule donnée en décembre-janvier, le 7.12 à Miège (aSi).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

2 le 4.1 à Ardon (beP, eRe).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

2 mentions hivernales: une le 7.12 à Sierre (Rey) et alar-me le 4.2 à St-Léonard (aSi).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP


Comme l'an dernier, présence notée à Visp (un ind le 21.12 et 3 le 2.1; Ker); en outre, 2 oiseaux sont également observés le 3.2 à Collombey-Muraz (rV).

ROITELET À TRIPLE BANDEAU, SOMMERGOLDHÄHNCHEN

Hiver particulier pour ce petit sylvidé ordinairement absent du canton à pareille saison: un ind le 28.12 sur le coteau de Fully (A. Bassin, beP), où en tout cas 4 oiseaux sont présents dans la première moitié de février (eRe); plus en aval, 1 le 26.1 à Vionnaz (eS).



117 • 1999
Page 76



La majeure partie des populations européennes de Tarsiers pâtres (Schwarzkehlchen) hivernent dans le bassin méditerranéen ou le long des côtes atlantiques. L'espèce supporte mal les hivers rigoureux, qui peuvent parfois provoquer de lourdes pertes dans les effectifs.

DESSIN JÉRÔME FOURNIER

TICHODROME, MAUERLÄUFER

Retenons, à basse altitude, un ind le 1.3 à Martigny, 460 m (cID), et un survolant les vignes le 5.1 à Lens, 700 m (aSi).

CRAVE, ALPENKRÄHE

Du 22 au 29.12 au moins, entre 20 et 45 ind se nourrissent sur des carcasses de moutons, à Evolène (Gey, paO).

CHOUCAS, DOHLE

40 ind vus les 22 et 26.1 à Vionnaz (rV).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

En aval de Sierre, remarquée le 23.1 à Vouvry (eS).

GRAND CORBEAU, KOLKRABE

156 ind en provenance du val d'Illeaz gagnent Monthey le 4.12 (rV); à Leukerbad, des comptages au dortoir à début février donnent un max de 274 ind le 4.2 (H. Flück). Ailleurs, notons encore une cinquantaine d'ind le 7.12 à St-Maurice (eRe) et 60 le 31.1 à Chamoson (aSi).

ÉTOURNEAU, STAR

3 les 10 et 23.12 dans la région sierroise (Rey), seules mentions pour la saison.

PINSON DU NORD, BERGFINK

Hivernage complet de 3-6 ind à Sierre, vus du 10.12 au 23.2 (Rey).

VENTURON, ZITRONENGIRLTZ

48 le 6.12 à Bratsch, 1500 m (M. Baumann), petites

troupe le 28.12 à Aven/Conthey, 1070 m, et le 4.1 à Ardon, 790 m (beP), 3 en plaine le 24.1 à Raron (Ker) et un m ch le 15.2 à Salgesch, 1100 m (aSi).

CHARDONNERET, DISTELFINK

Isolés ou petites troupes comptant jusqu'à 6 ind, vus durant tout l'hiver sur le coteau sierrois entre Chermignon et Salgesch (Rey); l'hivernage continu est également noté à Monthey, avec une dizaine d'ind concernés (rV). Plus ponctuellement, l'espèce est également mentionnée à Vionnaz (eS), Vernayaz (30 ind le 25.1, max hivernal; jeF), Martigny (beP), Martigny-Combe (cID, beP, eRe), Fully (eRe), Sion (Rey, aSi), St-Léonard (Rey) et Leuk (jDp).

TARIN, ERLENZEISIG

Séjour hivernal d'au moins 200 ind à Monthey, vus du 22.1 au 10.2 (rV).

LINOTTE, HÄNFLING

Très discrète: 3-4 ind en décembre-janvier à Sierre (Rey).

SIZERIN, BIRKENZEISIG

2 observations de plaine: une vingtaine le 30.12 à Sierre et 4 le 6.2 à Grône (Rey).

GROSBEK, KERNBEISER

De 1 à 8 hivernants signalés à Monthey du 2.12 au 23.2 (rV) et un seul à Sierre du 14.12 au 25.1 (Rey). L'espèce est également vue à Collombey-Muraz le 29.12 (4 ind; A. Bassin), à Martigny-Combe le 24.12 (4 ind; beP, eRe), à Martigny le 2.1 (F. Steiner), à Fully le 12.2 (eRe), à Sion le 26.12 et le 22.1 (respectivement 10 puis un ind; aSi), à Vex du 27.12 au 5.1 (Gey); plus grande concentration enregistrée, celle de 20 ind les 14-15.1 sur Bovernier (A.&L. Volet).

BRUANT JAUNE, GOLDAMMER

6 mentions pour 5 localités; max de 20 ind le 17.1 à Ayent (aSi) et le 10.2 à Dorénaz (eRe).

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

1 à 3 ind les 23 et 30.1 à Martigny (beP), un le 8.2 à Fully (eRe), 2 le 10.2 à Monthey (rV) et un le 15.2 à Leuk (jDp).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

21 mentions d'isolés ou de petits groupes comptant jusqu'à 20 ind, réparties également entre les mois de décembre, janvier et février, et concernant 13 localités, de Collonges (beP) à Filet (C. Katzenmaier); seule donnée hors vallée du Rhône, 3 ind le 19.2 à Vollèges (eRe).

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

Un hivernant à Ardon, vu les 14 et 28.12 (aSi; beP); en outre, les 3 oiseaux observés à début février – à Martigny le 8 et à Collonges le 10 (beP; eRe) – ont peut-être également séjourné dans la région.

LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1998 FRÜHJAHR UND SOMMER 1998

Dans la continuité d'un hiver particulièrement clément, le printemps débuta dans une ambiance chaude, sèche et ensoleillée, ce qui permit à quelques espèces de faire leur apparition bien plus tôt qu'à l'accoutumée; ce fut le cas des migrateurs au long cours que sont la **HUPPE**, le **COUCOU**, le **MARTINET NOIR** ou la **FAUVETTE BABILLARDE**. La situation météorologique se détériora durant un mois d'avril généralement humide et peu ensoleillé; la neige fit même un retour à Pâques, et l'on put voir alors se former en plaine de grands rassemblements de **ROUGEQUEUES NOIRS**, de **TRAQUETS MOTTEUX** ou encore de **PIPITS SPIONCELLES**; dans la dernière décade du mois, les jours de "déblocage météorologique" marquèrent également les esprits par les fortes concentrations d'oiseaux migrateurs qu'ils

apportèrent, principalement des **FAUVETTES**, **POUILLOTS** et **GOBEMOUCHES**, avec, parmi ces derniers, un **GOBEMOUCHE À COLLIER**. Cette situation perturbée sous nos latitudes n'empêcha cependant pas certaines espèces comme la **PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR** de regagner prématurément nos contrées, peut-être portées par les forts vents du sud-est soufflant en avril en Méditerranée orientale, comme le suppose la Station ornithologique.

Par ailleurs, des **AIGRETTES GARZETTES** en nombre – bilan du reste au diapason du bon passage remarqué à l'échelle nationale –, l'incursion d'un **GRAND LABBE** sur le Léman valaisan, l'observation d'une **LOCUSTELLE LUSCINOÏDE** ou encore le plus haute mention de **TRAQUET OREILLARD** enregistrée jusqu'ici dans les Alpes figurèrent également au menu ornithologique de la saison.

Im Einklang mit dem milden Winter begann auch das Frühjahr warm, sonnig und trocken. Dies gestattete einigen Arten deutlich früher als üblich aufzukreuzen. Dies war bei den Langstreckenziehern **WIEDEHOPF**, **KUCKUCK**, **MAUERSEGLER** und **KLAPPERGRASMÜCKE** der Fall. Die Witterungssituation verschlechterte sich im insgesamt feuchten und sonnenarmen April, der über Ostern wieder Schnee brachte. In den Niederungen gab es grosse Massierungen von **HAUSROTSCHWÄNZEN**, **STEINSCHMÄTZERN** und **BERGPIEPERN**. Im letzten Monatsdrittel brachten die Tage mit Wetterbesserung auch starke Konzentrationen von Zugvögeln, namentlich Grasmücken, Laubsänger und Schnäpper, worunter auch ein **HALSBANDSCHNÄPPER**. Die meteorologischen Störungen in unseren Breiten vermochten allerdings nicht zu verhindern, dass gewisse Arten wie der **NEUNTÖTER** verfrüht in unsere Gegend gelangen. Die Schweizerische Vogelwarte vermutete, dass sie möglicherweise von den im April im östlichen Mittelmeerraum aufgetretenen starken Südostwinde profitiert hatten.

Daneben fanden sich **Seidenreiher** zahlreich ein – analog wie in der übrigen Schweiz. Das Auftreten einer **SKUA** auf dem Walliser Abschnitt des Genfersees, die Beobachtung eines **ROHRSCHWIRLS** und die bis anhin höchste Beobachtung eines **MITTELMEERSTEINSCHMÄTZERS** in den Alpen bereicherten ebenfalls das ornithologische Menu der Saison.

PLONGEON CATMARIN, STERNTAUCHER

Remontée des hivernants remarquée le 27.3 (4 ind) et le 9.4 (2 ind) sur le lac au Bouveret (C. Chautems).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Migrateurs aperçus en février à Sierre (1 les 6 et 10.2 et 2 les 11 et 13.2; Rey, aSi) et sur le Rhône de Collonges (1 les 10 et 26.2; eRe).

CORMORAN, KORMORAN

Migration notée du 5.3 à St-Maurice (1 ind; Rz) jusqu'au 3.5 à Martigny, où jDp observe un retardataire.

BIHOREAU GRIS, NACHTREIHER

Passage noté entre le 9.4 et le 8.6 à Leuk (Rey), où sont concentrées la quasi-totalité des observations. 2 seules mentions en dehors de ce site: 1 ind le 9.4 à Martigny (bV) et 2 le 1.5 à Fully (liM).

CRABIER CHEVELU, RALLENREIHER

Un le 1.6 à Sion (rA).

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Passage fourni débutant relativement tôt avec 2 ind observés à Grône dès le 5.4 (rA, mPe, Rey, aSi), site où l'on note un max de 5 ind le 21.4 (V. Feller). Ailleurs, des isolées sont observées à Conthey le 14.4 (C. Meisser), le 1.5 (mPe), le 3.5 (beP) et le 22.5 (mPe), à Ardon le 16.4 (B. Borgazzi), à Martigny le 28.4 et le 1.5 (beP; hDu, yFr), et à Leuk le 22.5 (K. Safi), seule mention pour le Haut-Valais; l'effectif maximal pour le printemps est enregistré à Fully le 10.5 (11 ind, rA), localité où 2 ind sont encore vus le 28.5 (A. Guggisberg, L. Juillerat). 3 dernières le 2.6 à Sion (rA).

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

Une le 15.4 à Saillon (H.-R. Kunz).

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

Un erratique vu le 14.6 à Fieschertal, 2000 m (jmGa).

HÉRON POURPRÉ, PURPUREIHER

Assez bon passage, échelonné entre le 5.4 à Leuk (aSi) et le 13.5 au même endroit (U. Kägi); max de 3 ind le 2.5, toujours à Leuk (mGe). Hormis cette localité, signalé dans la région Martigny-Fully le 19.4 (gCa, jDp), les 26-27-28.4 (beP), le 1.5 (2 ind; liM), le 3.5 (jDp) et le 6.5 (hDu); à Monthey, le 1.5 (nJ); à Grône, le 22.4 et le 2.5 (mPe; aSi); à Gampel le 1 et le 3.5 (hDu; rA).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

Une le 22.5 à Leuk (K. Eigenheer).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSTORCH

2 le 3.5 sur Fully (jeF), puis une le 13.5 à Conthey (rA).

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

1 ind à Sierre du 10 au 18.3 (Rey), et 1 sur le Rhône de Collonges le 5.4 (eRe).

TADORNE CASARCA, ROSTGANS

Séjour d'un ind à Grône du 26.3 au 14.4 (div obs), première mention en Valais central.

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Première migratrice le 21.2 à Martigny (cLD, beP), où l'espèce est revue le 7.3 (5 ind; beP). Mis à part une mention de 2 ind le 23.3 à Finges (Rey), la totalité des observations restantes concerne les marais de Grône, où l'on note un max de 28 ind le 28.3 (yCr).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

Retour le 21.2 à Martigny (18 ind; beP).

CANARD PILET, SPIESSENTE

A Grône, un le 16.3 (Udry) et 2 le 21.4 (V. Feller, mPe, Rey); à Conthey, un le 13.4 (F. Udry par rA).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

Passage perceptible entre le 9.3 à Grône (Rey) et le 3.5 à Ardon (2 ind; beP). Max de 15 ind le 22.3 à Monthey (rV).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE

2 le 21.3 à Leuk et 2 le 24.3 à Grône (Rey).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Un m le 5.3 à Grône (aSi).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

Premier migrateur les 19-20.2 sur le Rhône de Fully (eRe), et 2 derniers le 28.4 sur celui de St-Maurice (jeF), site regroupant la majeure partie des observations. Ailleurs, notons un c à Conthey le 8.3 (rA).

BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

Premières migratrices le 2.5 à Leuk (mGe) et le lendemain à Martigny (jDp).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Arrivée tardive, le 5.4 à Leuk (aSi). Les 2 ind vus le 12.5 à Morgins, 1600 m (rV) sont très probablement des migrants attardés.

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Un en vol amont le 19.3 à Martigny (beP), un le 29.3 à Martigny-Combe (beP), un le 8.4 à Grône (Rey), un le 13.4 à Raron (hDu, liM), un le 19.4 à Vionnaz (nJ, eRe), et un dernier attardé le 17.5 à Brentjong (liM).

GYPAÈTE, BARTGEIER

Mis à part Trubel qui demeure tout l'été à Leukerbad, notons un subad sur Liddes le 19.5 (T. Roduit), un subad/ad le 24.7 à Oberwald (Kosper), un subad/ad le 7.8 sur Mex (T. Berra) et un imm/subad (peut-être "Valdieri", Mercantour 1996) le 20.8 à Binn (M. Zurschmitten).

CIRCAËTE, SCHLANGENADLER

1-2 ind dans la région comprise entre Martigny et Saillon vus entre le 26.4 (beP) et le 11.6 (rA), 1 ind à St-Léonard vu le 29.4 et le 29.7 (aSi), 1 le 6.6 à Gampel (A. Guggisberg, L. Juillerat), 1 le 13.6 à Ausserberg (liM) et 1 le 18.6 au Simplon, 2040 m (P. Blaser).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Premier migrateur mentionné, un m ad passe le Grand-St-Bernard, 2480 m, le 26.3 (liM); cette donnée constitue une des rares observations printanières de l'espèce sur un col alpin. Vu ensuite régulièrement en 7 localités jusqu'au 28.5 à Turtmann (hDu).

BUSARD ST-MARTIN, KORNWEIHE

Hormis le Chablais, signalé le 23.4 à Bratsch, 1600 m (C. Vogel) et le 26.4 à Lens (aSi).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

C en vol aval le 26.4 à Martigny (beP), puis 1-2 ind les 1-2-3.5 dans la région comprise entre Leuk et Gampel (rA, hDu, mGe), 1 à Fully le 4.5 (rA) et 1 dernier les 26-27.5 à Leuk (aSi; rA).

EPERVIER, SPERBER

Un oiseau, très probablement migrateur, à l'altitude de 3530 m le 22.4 à Fieschertal (R. Graf).

BALBUZARD, FISCHADLER

Premier le 8.4 à Grône (Rey), puis 1 en vol aval au soir du 12.4 à Sion (rA); c'est probablement cet ind qui est revu en halte migratoire les 13 et 14.4 à Conthey (F. Udry par rA). Suivent 2 ind à Grône le 13.4 (mPe) et 1 le 15.4 au Bouveret (nJ); ajoutons à cela le séjour d'un ind à Leuk, du 12 (T. Weber) au 19.4 (gCa et al).

FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE

Grande majorité des observations concentrées dans la région Leuk-Gampel, où l'espèce est régulièrement observée pendant un mois, du 1.5 (3 ind; yFr) au 1.6 (2 ind; mPe, M. Ritschard); max de 7 ind le 17.5 (M. Baumann). Ailleurs, 2 m et une f le 1.5 à Fully (liM) et 1 ind le 2.6 à Vionnaz (nJ). Bien plus tard dans la saison, un ind en erratisme estival le 16.7 à Leuk (S. Keller).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Le 13.4 à Raron (liM) et le 18.4 à Vionnaz (nJ).

FAUCON HOBREAU, BAUMFALKE

Premier le 18.4 à Vionnaz (nJ), puis le lendemain à Vouvry, Martigny (gCa) et Leuk (mPe). Suivent des isolés les 10 et 11.5 à Leuk (mBa, N. Koller; M. Wettstein), le 21.5 à Turtmann (beP) et le 27.5 à Salgesch (Rey).

CAILLE, WACHTEL

Retour le 26.4 à Martigny (beP).

MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFUHN

1 ind en escale à Grône, du 6 au 12.4 (mPe).

MARQUETTE POUSSIN, KLEINES SUMPFUHN

Une f le 9.4 à Brig (phW; CAVs).

FOULQUE, BLÄSSHUHN

A noter encore une septantaine d'ind le 16.4 à Grône (eRe).

ECHASSE, STELZENLÄUFER

Une les 1-2.5 à Finges (Rey), pour la 4ème fois en Valais.

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER

Excepté Finges, où il apparaît le 2.4 (2 ind; Rey), on le note à Grône du 5 au 7.4 (rA, mPe, Rey, aSi), à Leuk le 13.4 (4 ind; hDu, liM) et le 9.5 (Sal), à Vouvry le 19.4 (eRe), à Martigny le 25.4 (mBa, N. Koller) et à Conthey le 3.5 (beP).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Arrivée à Vouvry le 1.3 (13 ind; eRe). Mis à part ce site, vu à Leuk le 30.3 (1 ind; Rey), Turtmann le 5.4 (1 ind; Sal) et Martigny le 13.4 (3 ind; hDu, liM) et le 9.5 (1 ind; beP). Très faible passage.

COMBATTANT, KAMPFLÄUFER

Un le 3.4 à Grône (Rey), puis, au même endroit, 2 ind du 5 au 7.4 (rA, mPe, aSi); suivent des isolés vers la mi-avril à Conthey (C. Meisser) et les 16 et 19.4 à Vouvry (eRe).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

2 premières le 9.3 à Grône (Rey), où 1 ind est encore mentionné le 1.4 et du 19 au 28.4 (mPe). Ailleurs, une le 5.4 à Vionnaz (nJ), une le 13.4 à Conthey (F. Udry par rA) et dernière le 3.5 à Martigny (jDp).

COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL

A Vouvry, 1 le 16.4 et 2 le 19.4 (eRe).

CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL

Les champs inondés de Vouvry accueillent 4 ind le 22.3 (rV), 3 ind les 14 et 16.4 puis un seul le 19.4 (eRe); l'espèce est également notée à Conthey les 6 et 14.4 (paM; C. Meisser).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

Un les 2 et 5.4 à Finges (Rey) et un les 21 et 28.4 à Grône (V. Feller; mPe, Rey).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Passage concentré sur un seul mois, entre le 29.3 à Grône (1 ind; mPe) et le 28.4 à Conthey (1 ind; rA). Max de 4 ind le 1.4 à Grône (mPe) et du 14 au 19.4 à Vouvry (eRe).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

Quasiment dans les mêmes dates que l'espèce précédente; migration perçue entre le 4.4 à Grône et le 2.5 au même endroit (aSi); max de 7 ind le 29.4, toujours à Grône (mPe). Isolés également vus à Vouvry les 14, 16 et 19.4 (eRe), à Martigny le 30.4 et le 1.5 (rA; beP) ainsi qu'à Conthey le 1.5 (mPe).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Retour à Finges le 21.4 (Rey). En dehors de ce lieu, nombre dérisoire d'observations: 1 le 2.5 à Sierre (aSi), 3 le 8.5 à Grône (mPe) et derniers les 21-22.5 à Leuk (beP; H.-R. Kunz).

GRAND LABBE, SKUA

L'oiseau hantant le Léman fait 2 incursions valaisannes au Bouveret, le 3.5 et le 26.5 (hDu; CAVs).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

Seulement 7 observations, dont 6 à Grône, où l'on commence avec 30 ind le 27.3 (Rey). Dernière le 21.5 à Turtmann (beP).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

4 le 12.4 à Vernayaz (jeF), 3 le 11.6 à Saillon (rA) et 1 le 13.6 à St-Léonard (mPe).

GOÉLAND INDÉTERMINÉ, UNBEST. GROSSMÖWE

2 ind, peut-être des Goélands bruns, le 21.5 en vol aval à Turtmann (beP).

PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE

6 premiers le 1.3 à Sierre (aSi), puis relevons une centaine d'ind le 14.3 à Leuk (Rey).

TOURTELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Très peu vue, seulement 2 mentions de migratrices à Martigny: 2 le 26.4 et une le 3.5, victime d'un Faucon pèlerin (beP).

COUCOU, KUCKUCK

Retour particulièrement précoce le 18.3 à Ausserberg (P. Blaser), puis premiers ch déjà le 4.4 à Vex (M. Pitteloud) et le 5.4 à Collombey-Muraz (Barbey). Les ind signalés le 5.4 à Champéry (anonyme), le 9.4 à Vernamiège (E. Frey) et Hérémence (R. Guex), et le 10.4 à Icogne (I. Simonetta) ne font que confirmer une arrivée probablement bien hâtive, mais dont l'image est peut-être accentuée par un appel dans la presse.

MARTINET NOIR, MAUSERGLER

2 bonnes semaines d'avance par rapport à l'habitude: premiers les 4-5.4 à Grône (aSi).

MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER

3 premiers le 11.4 à Grône (mPe).

GUÉPIER, BIENENFRESSER

En dehors des sites de nidification, 1 le 20.5 à Leuk (anonyme).





Huppe fasciée (Wiedehopf) tenant au bec sa proie essentielle en Valais: la courtilière.

DESSIN JÉRÔME FOURNIER

HUPPE, WIEDEHOPF

Retour très hâtif: une le 1.3 déjà à Fully, puis le 3.3 au même endroit (E. Gard par rA) et une le 22.3 à Leuk (mPe). Les observations ne se généralisent néanmoins qu'à partir du 5.4, jour où l'espèce est signalée à Monthey (paM).

TORCOL, WENDEHALS

Premiers ch le 30.3 à Uvrier (rA) et le lendemain à Martigny (beP).

ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHEHLERCH

4 observations, toutes acceptées par le CAVS: à Leuk, une le 5.4 déjà (rlm, beP), 3 le 19.4 (jFi, hDu, jDp, tGu, l. Henry) et une le 3.5 (jFi, D. Gebauer, M. Schweizer, adJ); à Fully, une le 19.4 (l. Henry et al).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCH

Une le 25.2 à Salgesch et une le 28.2 à Venthône (Rey), les 2 seules mentions de migratrices.

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCH

Retour noté le 8.2 à Martigny (2 ind; beP), puis une cinquantaine d'ind le 14.2 à Port-Valais (G. Gilliéron).

HIRONDELLE DE RIVAGE, Uferschwalbe

Première le 6.4 à Grône, où l'on trouve encore une vingtaine d'ind le 14.6 (mPe).

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSenschwalbe

Arrivée le 21.2 à Dorénaz (N. Erard, jeF) puis le 28.2 à Visp (Sal); on en trouve déjà 200 le 8.3 à Grône (mPe).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUSCHSCHWALBE

Retour le 30.3 à Leuk (Rey); arrivée massive dès le 5.4 à Grône, où mPe compte une centaine d'ind.

HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSCHWALBE

Première le 5.4 à Martigny (cD, beP).

PIPIT ROUSSELIN, BRACHPIEPER

Le passage, noté entre le 13.4 à Raron (hDu, liM) et le 22.5 à Gampel (K. Eigenheer), culmine le 1.5, jour où l'on

rencontre un min de 13 ind à Martigny-Fully (mBa, yFr, liM, beP), un min de 14 ind à Leuk (R. Aye, mBa, hDu, yFr) et 4 ind à Raron (hDu).

PIPIT DES ARBRES, BAUMPIEPER

Première mention du printemps, un ch bien précoce le 5.4 à Guttet, 1340 m (aSi).

PIPIT A GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

Un le 1.5 à Fully (liM).

PIPIT SPIONCELLE, BERGPIEPER

A noter une centaine d'ind le 13.4 à Agarn (liM), ainsi que 4 ind en migration le 22.4 sur Fieschertal, 3300 m (R. Graf).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

2 premières le 29.3 à Grône (mPe). A relever une observation de la ssp *feldegg* le 2.5 à Martigny (eRe; CAVS).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Retour dès le 8.2 à Martigny (beP), puis le 11.2 à St-Maurice (Rz), où l'on signale déjà 20 ind le 14.2 (eRe). En été, une erratique probable le 2.7 sur Evolène, 2670 m (B. Piot).

ROSSIGNOL, NACHTIGALL

Premières notes le 11.4 à Leuk (T. Weber) et le 13.4 à Martigny et Fully (hDu, liM); le passage ne s'emballe cependant qu'à partir de la dernière décade d'avril.

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Une les 11-12.4 à Leuk (T. Weber) et une très tardive le 19.5 à Grône (C. Chautems).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

Blocage migratoire mis en évidence le 13.4 dans le Haut-Valais: une cinquantaine d'ind à Raron et un min de 300 à Leuk (liM).

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

Arrivée le 5.4 à Martigny (hDu, liM), Sion (rA) et Leuk (aSi).

TARIER, BRAUNKEHLCHEN


Premier hâtif le 5.4 à Turtmann (Sal), puis, le 13.4, 3 ind à Leuk et 1 à Raron (hDu, liM); la migration ne se généralise véritablement qu'à partir du 20.4, pour atteindre son sommet le 1.5, jour où l'on note un min d'une cinquantaine d'ind à Martigny (liM) ainsi qu'une soixantaine à Leuk (mBa).

PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

En dehors des sites occupés en février, dès le 1.3 à Vionnaz et Collombey-Muraz (eRe).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Le 5.4, 3 ind à Leuk (aSi) et 4 à Turtmann (Sal); le 13.4, apparemment jour de blocage météorologique, une centaine d'ind à Leuk et environ 50 à Raron (liM).



Rossignol, Nachtigall. – DESSIN JÉRÔME FOURNIER

TRAQUET OREILLARD, MITTELMEERSTEINSCHMÄTZER

Un m à gorge noire, de la ssp *O. h. hispanica*, le 21.6 à Riederalp, 1990 m (A. Guggisberg, L. Juillerat; CAVS).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

Arrivée précoce et massive le 3.2 à Vouvy, où rV observe un groupe de 120 ind; par la suite, 2 le 28.3 sur Varen, 1650 m (aSi), 2 le lendemain à Nax (aSi) et dernière le 13.4 à Leuk (hDu, liM).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL

14 mentions curieusement concentrées en une seule semaine, entre le 26.4 à Leuk et Martigny (mPe; beP) et le 3.5 à Martigny, St-Léonard et Leuk (jDp; aSi; M. Schweizer).

LOCUSTELLE LUSCINOÏDE, ROHRSCHWIRL

Un ch le 26.4 à Martigny (beP), 7^e mention valaisanne.

PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFRÖHRSÄNGER

A Martigny, un le 24.4 (mBa, liM), un ch du 26 au 29.4 (beP) et un le 3.5 (jDp).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÄNGER

Chante le 15.5 à Leuk (Rey).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHRÖHRSÄNGER

Dès le 26.4 à Grône (mPe, Rey).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER

Chante en migration le 1.5 à Martigny (liM), Fully (beP) et Leuk (mBa, yFr), où elle est entendue une nouvelle fois le 10.5 (F. Steiner).

HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER

2 à 4 ch le 3.5 à Martigny-Fully (jDp, jeF) et un le 13.5 à Saillon (jeF).

HYPOLAÏS POLYLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

Premier oiseau le 9.5 à Fully (beP).

FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE

Un m le 26.4 à Martigny (liM, hDu; CAVS).

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

Un ch avant-coureur bien hâtif le 29.3 à Martigny-Combe (beP), puis régulièrement à partir du 18.4 à Miège (Rey); à souligner une quinzaine de migratrices en escale le 24.4 à Fully (mBa, liM).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

- 2 premières migratrices le 21.4 à Grône (V. Feller).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

Cris entendus le 2.3 à Lens (aSi).

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

Retour dans les temps, le 22.4 à Lens (Rey).

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

6 premiers le 24.4 à Fully (mBa, liM).

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

Hormis les quelques mentions hivernales, pas avant le 15.3 à Grône (mPe).

POUILLOT FITIS, FITIS

Le 4.4 à Sierre (aSi).

GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNÄPPER

Arrivée massive le 24.4 à Martigny-Fully, où l'on ne dénombre pas moins de 22 ind (mBa).

GOBEMOUCHE À COLLIER, HALSBANDSCHNÄPPER

Un m le 25.4 à Martigny (beP; CAVS).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER

En retard, un le 24.4 à Grône et 10 le même jour à Fully (mBa).

RÉMIZ, BEUTELMEISE

A Leuk uniquement, 4 ind le 5.4 (aSi), 2 le 11.4 (T. Weber), 1 le 13.4 (hDu, liM) et 6 le 19.4 (hDu, jDp).

LORIOT, PIROL

Normalement, premiers le 25.4 à Gampel (C. Vogel) et le 29.4 à Fully (rA).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

Débarquement hâtif de 4 ind le 24.4, dont 2 à Salgesch (beP) et 2 à Martigny (mBa, liM).

CHOUCAS, DOHLE

A relever 4 migrateurs le 30.3 à Baltschieder (Ker).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Hors Haut-Valais, une le 15.3 à Vionnaz (clD, beP, eRe) et observation surprenante d'un ind le 21.3 dans une clairière à Champéry, 1400 m (nJ).

ETOURNEAU, STAR

Retour le 19.2 à Fully et Sierre (beP; Rey).

PINSON DU NORD, BERGFINK

Dernier le 5.4 à Martigny (hDu); à noter une quarantaine le 7.3 aux Giettes/Vérossaz, 1290 m (eRe).

SERIN, GIRLITZ

Premier le 27.2 à Martigny (beP).

VENTURON, ZITRONENGIRLITZ

Mentionnons une troupe de 22 oiseaux le 13.4 à Leuk, 620 m (liM).

LINOTTE, HÄNFLING

"Tombée" subite et massive de 70 ind le 19.2 à Martigny (beP).

GROSBEK, KERNBEISSER

Les 6 ind observés le 10.4 à Grône (mPe) nous permettent d'appréhender une migration de printemps souvent peu perceptible.

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

Arrivée dans les temps, dès le 19.4 à Leuk (jDp), le passage culminant dans les premiers jours de mai.

BRUANT DES ROSEAUX, ROHAMMER

Les 19 et 21.2 à Martigny (beP), puis 12 ind le 1.3 à Grône (aSi).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

Hors sites de nidification du Haut-Valais, vu à Martigny le 13.4 (hDu, liM) et ch en escale le 1.5 à Fully (liM).

INDICES DE NIDIFICATION 1998 BRUTNACHWEISE 1998

Le temps exceptionnellement beau qui régna durant tout le mois de mai s'avéra optimal pour la nidification des oiseaux; il fut un des facteurs qui permit à la **HUPPE** de connaître un excellent succès de reproduction, et peut-être n'est-il pas étranger à l'installation très élevée d'un couple de **PÂTRES** dans le Haut-Valais. Autre événement marquant de la saison, la redécouverte du **PIPI FARLOUSE NICHEUR**, plus de trente ans après les premiers et seuls indices de nidification notés dans le canton.

Au chapitre des mauvaises nouvelles, c'est la première année depuis 1992 qui ne voit aucun **GUÉPIER** éclore sous le ciel valaisan; quant aux effectifs du **BRUANT PROYER**, avouons que leur maigreur a de quoi provoquer de plus en plus de soucis...

Das überaus gute Wetter, das den ganzen Mai hindurch herrschte, war für die Vogelbruten optimal; es war einer der Gründe für den ausgezeichneten Bruterfolg beim **WIEDEHOPF**. Vielleicht war es auch mitverantwortlich für die Ansiedlung eines **SCHWARZKEHLCHEN**-Paars in ungewöhnlicher Höhe im Oberwallis. Ein anderes bedeutendes Ereignis war die Wiederentdeckung des **WIESENPIEPERS** als Brutvogel, dies mehr als dreissig Jahre nach den ersten und einzigen im Kanton gefundenen Bruthinweisen.



Schlechte Nachrichten gab es jedoch bei **BIENENFRESSER** und **GRAUAMMER**: Während der fliegende Edelstein erstmals seit 1992 als Brutvogel fernblieb, muss man sich um die schwindenden Bestände von letzterer mehr und mehr Sorgen machen...

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Nidification certaine de c isolés à Collombey-Muraz (paM), Monthey (liM), Martigny (beP) et Finges (beP, Rey), et nidification probable d'un c aux Rigoles de Vionnaz (nj, eS); à Grône, au moins 3 c dénombrés (Rey, aSi).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Une famille le 28.5 à Collombey-Muraz, apparemment une première pour le site (rv).

BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL

Nidification certaine à Grône (c produit 1 jeune; mPe, Rey, aSi) et Leuk (div obs). Ailleurs, retours réjouissants de l'espèce en des lieux autrefois occupés puis abandonnés: si l'ind observé le 7.6 à Montorge/Sion (B. Fuhrer), site où l'unique nidification de l'espèce remonte à 1991, est très probablement un dernier migrateur, les 2 chanteurs entendus de mai à juillet à Finges (beP, Rey, aSi), où le Blongios n'avait plus été noté ces dernières années, relancent les espoirs d'une nouvelle installation...

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

2 ind paraden le 1.6 à Sion (rA), sans suite apparente.

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

A Grône, les espoirs émis l'an passé se concrétisent dans un premier temps: pour la première fois depuis 1983 (Sierro 1992), un c parvient à déjouer la hausse provoquée du niveau de l'eau et produit 7 jeunes, qui disparaîtront cependant de façon subite (mPe, Rey, aSi); de plus, un ad sera trouvé mort accidenté (anonyme par aSi). Non loin de là, à Granges/Sierre, les amours d'un c présent début mai et adoptant un comportement agressif (aSi) resteront sans lendemain...

CANARD COLVERT, STOCKENTE

Familles signalées à Vionnaz (nj), Martigny (beP), Grône (mPe) et Derborence/Conthey, 1450 m (A. Barbalat, jcT). Ailleurs, nidification suspectée à Collombey-Muraz (rv) et Finges (jcT).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

3 c nichent avec succès à Port-Valais (fE, nj).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

Soupçons de nidification à Vouvry (fE, eS). La présence d'un c sur le Rhône de Saillon entre le 14 et le 19.4 (H.-R. Kunz) n'engendrera pas de suites visibles.

FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE

Nidification très probable d'un c à Collombey-Muraz (nj, liM, eS, rv).

CAILLE, WACHTEL


Du Haut-Valais essentiellement, avec, en plaine, un min de 4 ch le 22.5 à Leuk (K. Safi), 3 ch le 28.5 à Turtmann (hDu) et 4 ch le 7.5 à Gampel (Rey); plus en amont, un ind vu à Baltschieder le 17.6 (Ker); en altitude, un ch le 20.6 à Erschmatt, 1520 m (H.-R. Kunz). Plus bas dans la vallée, un ch le 2.6 à Finges (aSi), ainsi qu'un autre les 16 et 19.5 à Chermignon (aSi), seule donnée pour la partie francophone du canton.

RALE D'EAU, WASSERRALLE

Ch entendus à Vionnaz (2 ch; eS), Grône (Rey, aSi) et Sierre (Rey); de plus, nidification certaine à Finges (2 c; Rey) et probable à Monthey (liM).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

Notamment 3 c nicheurs à Leuk, 2 à Finges et 2 à Grône (Rey), ainsi que 2 à Martigny (beP); l'espèce est également signalée à Collombey-Muraz (hDu, liM), Saillon (hDu) et Sierre (Rey). Enfin, eS note la réinstallation de l'espèce aux Rigoles de Vionnaz.



Un nicheur typique des vergers ou des prairies entrecoupées de haies et de bosquets: le Torcol (Wendehals). – DESSIN JÉRÔME FOURNIER

FOULQUE, BLÄSSHUHN

Nidification signalée seulement en 3 sites: Martigny (beP), Grône et Leuk (aSi).

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER

6 territoires comptés dans un recensement partiel le long du Rhône de Finges (aLu).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Le 2.5, beP compte 6 m à Vouvry; en espérant que chacun soit apparié à une f couvant, nous plafonnons à 6 c... Aucune preuve de nidification réussie.

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

Dans le Chablais, croule entendue sur Collombey-Muraz et Monthey (fE), et espèce signalée à Champéry et Troistorrens (rv). Ailleurs, croule encore perçue sur Martigny-Combe (fE), dans le val Ferret/Orsières (beP) ainsi qu'en 6 lieux distincts du bois de Finges (aSi).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

alu comptabilise 8 territoires dans la moitié amont du Rhône de Finges. Dans la vallée de Conches, nid contenant 4 œufs découvert le 25.6 à Reckingen, 1330 m (D. Klausener).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Très peu signalée; chante le 2.5 à Grône (aSi) et le 17.5 à Finges (beP).

PETIT-DUC, ZWERGÖHREULE

Après les bons résultats du recensement de l'an dernier, petite désillusion: seulement 2 c à Ayent (aSi); les 2 c signalés à Vex (aSi) mettent cependant un peu de baume sur notre douleur !

GRAND-DUC, UHU

5 sites occupés dans la plaine du Rhône, dont 2 avec nidification certaine; en montagne, 4 sites avec indices de présence.

HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE

Silence radio...

ENGOLEVENT, ZIEGENMELKER

1 ch à Aven/Conthey, 5 ch à St-Léonard-Flanthey, 5 ch à Finges, densité exceptionnelle de 17 ch sur environ 2 km² à Salgesch (aSi) et 1 c à Leuk (beP).

MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER

Vu le 19.6 à Derborence/Conthey (A. Barbalat) et le 17.7 au Sanetsch/Savièse (paM).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Nidification probable à Grône (mPe) et présence en juin à Saillon (mD, J.-C. Praz).

GUÉPIER, BIENENFRESSER

Sombre année pour l'espèce dans notre canton: le seul c installé dans le Haut-Valais, s'étant établi dans un tas de terre,

a vu sa loge contenant 9 œufs mise à jour par l'activité d'un trax (rA, P. Vogel).

HUPPE, WIEDEHOPF

Les 12 c reproducteurs recensés entre Fully et Saillon, dont 11 cantonnés dans la plaine du Rhône et un seul sur le coteau, ont fait l'objet d'une étude approfondie. Tous installés dans des sites artificiels - des nichoirs dans 11 cas sur 12 -, ils ont globalement connu un très bon succès de reproduction: 9 c ont mené à bien au moins une nichée, et la moyenne du nombre de jeunes par nidification menée à terme s'élève à 5.7 (ARLETTAZ, R., J. FOURNIER & N. ZBINDEN 2000). Plus en amont, ch signalés à Grône, St-Léonard, Lens, Sierre et Finges; à noter une nidification certaine à Montana, 1060 m (Rey). Curieusement aucune mention en amont de Finges.

TORCOL, WENDEHALS

Seule mention en aval de Martigny, 1 ch entendu les 20, 21 et 26.4 à Evionnaz, premier indice de nidification depuis quelques années, en un site où l'espèce était régulière dans les années 80 (nJ). Ailleurs, évoquons le triste sort réservé à ces jeunes ayant grandi en nichoir à Arbaz, et finalement dévorés par une Couleuvre d'Esculape (aSi).

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

Dans le Chablais, tambourinage le 16.5 sur Vionnaz, 1450 m (beP, eRe) et présence signalée en juillet sur Collombey-Muraz et en octobre sur Vouvy (O. Turin). Sinon, m nourrissant au nid le 14.6 sur Martigny-Combe, 1630 m (fE), 1^{ère} preuve de nidification certaine en dehors du Chablais, ainsi qu'un ind vu le 19.5 à Guttet, 1910 m (anonyme).

PIC ÉPICHETTE, KLEINSPECHT

Par rapport aux années précédentes, soulignons 2 ch le 29.3 à Martigny-Combe (beP).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Signalée à St-Léonard, Sierre (aSi), Salgesch (beP, aSi), Brentjong (Rey) et Guttet (aSi).

HIRONDELLE DE RIVAGE, Uferschwalbe

Soupçons d'installation ou simple erratisme à Grône (Rey), où l'espèce est encore notée à mi-juin puis 2-3 ind les 12 et 16.7 (aLu; mPe, Rey). Affaire à suivre...

HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSCHWALBE

La colonie rupestre de Zmutt/Zermatt, qui comptait 40 nids en 1964, est sur le point de s'éteindre: un seul c nicheur cette année (moJ, jS).

PIPIT DES ARBRES, BAUMPIEPER

Chanteurs répartis entre les altitudes de 900 m à Ayent (aSi) et de 2100 m à Evolène (mTh, jCT).

PIPIT FARLOUSE, WIESENPIEPER

Redécouvert nicheur en Valais, exactement au même endroit que celui où il avait été trouvé pour la première fois dans le canton en 1962: au moins une famille le 26.7 à Riederalp, 1910 m, ainsi qu'un ind isolé le même jour 500 m plus loin (U. Glutz von Blotzheim).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

Nidification notée uniquement dans les bastions traditionnels du Haut-Valais, à Leuk (liM, beP) et Gampel (liM, Rey, Sal, A. Voirol).

CINCLE, WASSERAMSEL

Nicheur sur Zermatt, 2340 m (moJ, jS).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE


Indices de nidification les plus élevés, 2 ch le 11.7 sur Evolène, 3310 m (B. Piot).

ROSSIGNOL, NACHTIGALL

Mention la plus en amont: 5 ch le 10.5 à Visp (Sal); la plus élevée: comportement nuptial le 17.5 à Brentjong, 950 m (liM); aucune donnée en provenance des vallées latérales. Quelques comptages ponctuels: 13 ch sur 3 km² de la plaine de Leuk le 22.5 (K. Eigenheer), 15 sur 3km² de la plaine de Turttmann le 13.5 (U. Kägi) et 12 sur moins d'1 km² à la colline du Hubil à Finges le 17.5 (beP).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

A noter 1 c nicheur à Evionnaz (nJ), seule mention en aval



Habitant des pâturages, des tourbières ou des prairies humides, le Pipit farlouse (Wiesenpieper) a été trouvé nicheur en Valais en 1998.

DESSIN JÉRÔME FOURNIER

de Martigny-Fully. En altitude, un ch le 31.5 à Ried-Mörel, 2080 m (S. Bächli).

TARIER, BRAUNKEHLCHEN

Dans la plaine romande, un ch le 31.5 à Vouvy (fE). En altitude, nidification notée jusqu'à 2300 m à Törbel (Sal) et Zermatt (paM).

PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Situation en aval de Leuk: 1 territoire à Port-Valais (liM), 1 à Vouvy (eRe, rV), 1 à Vionnaz (beP, eRe, rV), 1 à Collombey-Muraz (eRe, eS, rV), 6-7 dans la plaine de Collonges et Dorénaz (nJ, eRe), 10 à Martigny (beP), 1 à Fully (div obs), 1 à Saillon, 1 à Ardon, 2 à Sion (rA), 3 à St-Léonard (mPe, Rey, aSi) et 1 à Chalais (rA). Dans tout le canton, toujours mentionné en plaine, hormis 3 sites, dont 2 à Leuk, 900 m et 950 m (U. Kägi; liM), et un à Erschmatt, 1530 m (H.-R. Kunz, Rey), où la nidification certaine signalée représente la plus élevée qui soit connue à ce jour en Suisse. Première famille le 29.4 à Fully (rA); dernière le 5.9 à Martigny (beP).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Ch entendus entre 1420 m à Leukerbad (F. Borleis) et 3000 m sur Zermatt (M. Kappeli).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

Nicheurs signalés en montagne sur Fully (J.-M. Gisiger), Leytron (jeF), Evolène (H. Edelmänn, jCT), St-Luc (jeF), Guttet (H.-R. Kunz), Bratsch, Gampel (Sal), Zermatt (moJ, jCT, jS), Ried-Mörel (S. Bächli) et Greich (W. Burri, A. Guggisberg, Y. Schaefer); sur le coteau, à Rotafen/Leuk, 1080 m (Sal).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHSÄNGER

A relever un ch le 11.7 à Trient, 1530 m (fE).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHSÄNGER

Heureuse surprise, un c avec m ch entre le 18.5 et le 8.6 à Collombey-Muraz (liM, eS), nouveau site.

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

A Martigny, Fully (div obs), St-Léonard (mPe), Sierre, Salgesch (aSi) et Leuk (div obs).

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

A noter en juin 1-2 ch au bas du coteau sierrois, 600 m (Rey). Par ailleurs, relevons un min de 10 ch le 31.5 à Ried-Mörel, 2080 m (S. Bächli).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

1 ch le 6.5 à Fully (hDu) et 2 le 9.5 à Finges (Sal), sans suites concrètes; seul indice sérieux, un ch présent à Leuk en juin-juillet (div obs)... Triste bilan.

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

En altitude, un ch le 6.7 sur Icogne, 1700 m (Rey), un le 11.7 sur Saxon, 1850 m (beP) et un le 13.7 sur Mollens, 1900 m (Rey).

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

Retenons des ch signalés en des lieux peut-être moins

classiques pour l'espèce: le 30.5 sur Vouvry, 1200 m (fE), le 24.5 au col de Bretolet/Champéry, 1900 m (F. Klötzli), le 4.5 à Collonges (Rz) et le 18.7 à Orsières (eRe).

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

4-7 territoires à Finges (Rey) et un ch le 3.5 à St-Léonard (aSi).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAVERSCHNÄPPER

Un ch le 10.5 à Brentjong (liM), sauf erreur un site inédit.

TICHODROME, MAUERLÄUFER

En juillet, sur Evolène, un le 11 à 3320 m (B. Piot) et 1 c le 24 à 3100 m (mTh), indices très élevés ou simplement erratisme vertical.

LORIOT, PIROL

Ch entendus au Bouveret (hDu), à Vouvry (fE), Collombey-Muraz (paM, jeF), Monthey (nJ), Vernayaz (jeF), Grône (Rey), Sierre (aSi), Finges (Rey, aSi), Leuk (U. Kägi, J. Erard), Gampel (U. Kägi, Rey), Niedergesteln (Rey) et Baltschieder (Ker).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

En plaine, 1 territoire à Vionnaz (rV), 1 à Collombey-Muraz (eS), 2-3 à Evionnaz (nJ), 1 à Martigny (hDu, liM), 1 à Salgesch (beP), 2 signalés à Leuk et 3-4 à Gampel (div obs). En altitude, 1 c le 31.7 à Betten, 2000 m (W. Burri).

CHOCARD, ALPENDOHLER

Un c construit son nid le 12.5 à Leuk, 850 m (R. Furrer). Par ailleurs, 2 c antropophiles signalés au Simplon : l'un rôdant autour d'un clocher le 18.6, et un autre le même jour, nourrissant 4 jeunes dans un nid bâti sur l'Hospice du Simplon (P. Blaser).

CRABE, ALPENKRÄHE

Par rapport à l'année passée, retenons les présences signalées à Liddes, Bagnes, Fully, Saillon, Leytron, Savièse, Varen et Leukerbad.

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

Un ind le 15.7 à Leuk (Rey); nouvel indice en faveur d'une présence discrète de l'espèce en Haut-Valais.

MOINEAU CISALPIN, ITALIENSPELUNG

Nidification certaine à Sierre (Rey) et présence signalée à Zermatt (moJ, jS).

NIVEROLLE, SCHNEESPELUNG

Nourrit le 25.7 sur Zermatt, à 3090 m et 3290 m; dans les 2 cas, le nid a été construit sur un bâtiment (moJ, jS).

SIZERIN, BIRKENZEISIG

En plaine, un ch à Martigny (beP) et un à Saillon (hDu).

ROSELIN, KARMINIMPFL

Comme l'an dernier, la seule donnée provient de Geschinen (un ch en juin; anonyme).

GROSBEK, KERNBEISER

Une famille avec au moins 3 jeunes le 5.7 à Finges/Salgesch (beP). Ailleurs, 1 c le 10.5 à Brentjong (liM), 1 ind le 23.5 à Finges/Leuk (K. Safi), un ch le 7.6 à Visp (Sal) et présence quasi annuelle notée à Vex (Gey).

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

En plaine, ch à Raron (Sal), Leuk (V. Feller), Finges/Salgesch (aSi), Dorénaz (eRe) et Evionnaz (nJ, eRe). Hormis ces 2 dernières localités, également signalé du Bas-Valais à Troistorrents, 800 m, et Collombey-Muraz, 680 m (A. Bassin).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Retenons une donnée en provenance de Vionnaz, 1400 m (fE).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

Seules mentions en dehors de la zone comprise entre Leuk et Raron, une nidification certaine à Ayent, 1670 m (S. Keller) et un ch le 10.7 à Zermatt, 1660 m (M. Kappeli).

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

Signalé de Vionnaz (eS), Martigny (beP), Grône et Leuk (aSi).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

Uniquement à Leuk-Agarn (2-3 ch), Turtmann (2 ch) et Gampel (2 ch); la grande discrétion de l'espèce nous laisse bien songeurs...

L'AUTOMNE 1998 HERBST 1998

Dans son ensemble, l'automne fut maussade; les mois de septembre et octobre particulièrement se révélèrent très humides et pauvres en soleil. Les perturbations qui se succédèrent ainsi provoquèrent des retards parfois importants chez de nombreux migrants; parmi eux, le **MARTINET NOIR**, ainsi que toute une série de **PASSEREAUX**: **TRAQUET MOTTEUX**, **TARIER DES PRÉS**, **ROUGEQUEUE NOIR**, **ROUSSEROLLE EFFARVATTE**, **FAUVETTE GRISETTE**, **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE**, **PIPIET DES ARBRES**...

Dans la catégorie des Rapaces, le fort passage de **BUSARDS DES ROSEAUX** enregistré dans toute la Suisse, presque deux fois plus intense que la moyenne, trouva également un bon écho en Valais.

Au chapitre des originalités, nous citerons encore la halte d'un jeune **FLAMANT** et celle d'un jeune **BUSARD PÂLE**, la capture d'un **PIPIET À DOS OLIVE** au col de Bretolet, ainsi que la rencontre pour le moins inopinée d'une **CAILLE** levée sur un glacier...

Der Herbst war insgesamt unfreundlich, September und besonders Oktober waren sehr feucht und sonnenarm. Die vielen meteorologischen Störungen verursachten z.T. markante Verspätungen bei zahlreichen Zugvögeln, so etwa bei **MAUERSEGLER** und bei einer Reihe von Singvögeln: **STEINSCHMÄTZER**, **BRAUNKEHLCHEN**, **HAUSROTSCHWANZ**, **TEICHROHRSÄNGER**, **DORNGRASMÜCKE**, **SCHAFSTELZE**, **BAUMPIEPER**...

Bei den Greifvögeln schlug der in der ganzen Schweiz notierte starke, fast doppelt so intensive **ROHRWEIHEN**-Durchzug auch im Wallis deutlich durch.

Unter den Besonderheiten sind die Rast eines jungen **FLAMINGOS** und einer jungen **STEPPENWEIHE** zu erwähnen. Dazu kam der Fang eines **WALDPIEPERS** auf dem Col de Bretolet und die unerwartete Begegnung mit einer **WACHTEL**, die auf einem Gletscher aufgescheucht wurde...

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERTGAUCHER

Max de 18 ind le 4.10 à Grône (jcT).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Une seule mention: 1 migrateur le 20.10 à Sierre (Rey).

CORMORAN, KORMORAN

Une observation en juillet d'un ind très précoce (le 9.7 à Leuk; mPe), puis mention d'un groupe de 5 ind en migration le 7.8 sur Saxon, 2470 m (Ph. Bruchez). En septembre, notons 9 ind sur Ayent, 2400 m (rA); l'espèce apparaît dès le début du mois d'octobre à Grône (3 ind le 1.10 puis 8 le 3.10; Rey; mPe) et Sierre (16 le 3.10, mPe). Enfin, à Monthey, rV comptabilise un total de 4708 migrants répartis entre le 29.8 et le 20.11; max journaliers atteints les 9 et 10.10 avec respectivement 406 et 418 ind.

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

A noter un groupe conséquent de 31 ind le 6.10 à Grône (mPe). Dans le val d'Entremont, un ind séjourne au moins 15 jours en septembre à Liddes, 1250 m (Y. Darbellay par jeF); il est encore vu le 3.10 un peu plus en aval (nJ).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

Bon passage. Première observée le 20.9 à Bretolet (jHa et al), une le lendemain passant le col de la Forclaz/Martigny-Combe (F. Burnier), une le 9.10 empruntant la vallée du Trient à la hauteur de Vernayaz (beP, eRe), une le 12.10 vue à Martigny (jcT); enfin, séjour étonnant d'une juv à Illarsaz, du 17.10 au 1.11 au moins (clD, beP, eRe, rV).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

3 ind stationnent à Barme/Champéry le 17.9 pour cause de mauvais temps, et ne passent le col de Bretolet que le lendemain (jHa).

FLAMANT INDÉTERMINÉ, UNBEST. FLAMINGO

Apparition totalement insolite d'un juv le 2.9 à Grône (Rey), coïncidant parfaitement avec l'arrivée des 6 Flamants roses sur la rive sud du lac de Neuchâtel... Par contre, la mention d'un ind le 2.8 à Ulrichen (W. Lagger) concerne très probablement un échappé de captivité.

CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Notons 7 ind en escale le 17.10 à Martigny (C. Praplan, par beP) et une troupe impressionnante de 45 ind le 28.11 à Illarsaz, se nourrissant dans les champs de maïs broyés (rV).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

Un ind à Leuk le 9.10 (Rey), puis séjour de 1-2 ind à Grône du 11.10 au 21.11 (jeF, mPe, Rey).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

A Grône, un les 13 et 20.8 (R. Hauri, Rey) et 3 le 1.11 (mPe); à Conthey, un le 8.11 (yCr).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Notée à Grône dès le 13.8 (2 ind; R. Hauri, Rey); les troupes les plus importantes y sont enregistrées au cours des 2 premières semaines d'octobre, avec un max de 49 ind le 11.10 (mPe). Ailleurs, vue à Baltschieder le 17.9 (jeF), à Martigny les 1 et 24.10 (3 ind; clD, beP) et le 2.11 (4 ind; beP), à Finges le 4.10 (Rey), à Leuk le 6.11 (2 ind; Rey), à Vionnaz les 22 et 28.11 (n); 3 ind, rV) et sur le Rhône de Monthey le 24.11 (2 ind, rV).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

A relever des max de 115 ind le 11.10 à Grône (mPe), de 38 ind le 16.11 à Montorge/Sion (yCr) et de 51 ind le 29.11 à Martigny (beP, eRe).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

Un seul ind, qui séjourne à Grône du 19 au 31.8 (Rey).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE

Un le 19.8 à Martigny (beP) puis un du 7 au 15.9 à Grône (Rey).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

A Grône, un avant-coureur le 16.7, puis un le 1.11 et un le 15.11 (mPe).

EIDER À DUVET, EIDERENTE

Une quarantaine d'ind au Bouveret, du 25.9 au 4.10 en tout cas (J.-M. Duflon).

BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

En montagne, premières migratrices le 6.9 au col de Tenneverge/Emosson, 2480 m (rA) et sur Liddes, 2480 m (clD, beP, eRe); 9 ind passent le col de Balme/Trient le 19.9 (aSi) puis 3 ind le 22.9 (eRe, aSi). Dernière donnée hors Bretolet, une migratrice le 4.10 sur Martigny-Combe (beP, eRe). Au col de Bretolet, max journalier de 75 ind le 18.9 (jHa) avec une dernière mention bien tardive, le 21.10 (jGr).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Deux migrants le 14.8 au col de Bréona/Grimentz, 3100 m (J.-P. Gaillard); dernier au col de Bretolet, le 2.10 (jGr). Dans la vallée du Rhône, encore un le 24.9 à Martigny (clD; beP).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Le 9.8, un ind franchit le Gemmipass/Leukerbad, 2350 m (rA); autres données de montagne: un ind le 20.9 au Rawil/Ayent, 2400 m (rA), un le 22.9 au col de Balme/Trient, 2200 m (eRe, aSi) et un le 15.10 sur Bourg-St-Pierre, 2250 m (yCr). En plaine du Rhône, un le 4.10 à Grône (jcT), un le 6.10 et un le 7.10 à Martigny (beP), 2 le 6.10 et 1 le 20.10 à



Jeune Busard pâle (Steppenweihe) en escale aux Barges de Vouvry. – PHOTO BERTRAND POSSE

Monthey (rV), et un tout dernier le 13.11 à Lens (Rey). A Bretolet, max de 24 ind le 23.9 (jHa, nJ).

GYPAÈTE, BARTGEIER

Trubel reste toujours fidèle à son fief de Leukerbad. 2 autres oiseaux animeront l'automne valaisan: d'une part, Crystal (HS 1998), vu à Champéry entre le 23 et le 27.8 (M. Cheseaux), survole Evionnaz le 30.8 (M. Dorsaz) puis Chamoson le 31.8 et le 1.9 (F. Udry; rA), avant de revenir à Mex le 5.9 (paO) puis de se réinstaller sur Champéry entre le 9.9 et le 24.9 (jHa); il est revu une dernière fois le 13.10 à Leytron (S. Terraz). D'autre part, République 11 (HS 1998), vu le 6.9 à Finhaut (rA), est revu à Champéry le 23.9 (nJ), le 24.9 (P. Delacretaz), le 29.9 (B. Kientz, M. Ritschard) et le 9.10 (M. Cheseaux). Enfin, relevons 2 observations ponctuelles d'ind non identifiés: un ad le 29.8 à Nax (rV) et un ad le 3.9 à Oberwald (M. Bieri).

CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER

Migrateurs le 30.9 à Martigny-Combe (J.-M. Pillet) et le 17.10 sur Leukerbad, 2050 m (jmGa).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Forte migration, à l'image d'ailleurs de celle observée dans le reste du pays. 3 ind le 6.9 à Bavon/Liddes, 2480 m (clD, beP, eRe), 1 le 18.9 au Varneralp/Varen, 2200 m (rA), 1 à Binn le 25.9 (rA); le 19.9, jour où le record journalier pour la Suisse est battu dans le canton de Berne avec un passage de 252 ind, 38 passent le col de Balme/Trient (aSi), et le même jour on enregistre un passage maximal de 85 ind au col de Bretolet (hDu). En plaine du Rhône, 1 ind à Vouvry le 1.10 (rV), 2 le 4.10 à Martigny-Combe (beP, eRe), 1 le même jour à Port-Valais (J.-M. Duflon), 1 le 5.10 et 1 le 8.10 à Martigny (beP), et 1 le 8.10 à Grône (mPe).

BUSARD PÂLE, STEPPENWEIHE

Un juv les 18-19.10 à Vouvry (beP, eRe, rV, lWi; CAvS); 1^{ère} mention valaisanne et 16^{ème} pour la Suisse.

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Au col de Bretolet uniquement, 2 le 10.9 (jHa).

BUSARD INDÉTERMINÉ, UNBEST. WEIHE

Un ind, peut-être un Busard cendré, le 31.8 sur Blatten, 2400 m (W. Thönen).

EPERVIER, SPERBER

Relevons un max de 31 ind le 29.9 à Bretolet (P. Bosshard).

BUSE VARIABLE, MÄUSEBUSSARD

Toujours au col de Bretolet, passage le plus intense le 9.10, avec 49 ind (jGr).

BALBUZARD, FISCHADLER

En montagne, 1 ind le 22.9 à Balme (eRe, aSi). Concernant la plaine: à Leuk, 1 le 19.9 (Rey); à Martigny, 1 le 24.9 (cID, beP) et 1 le 6.10 (beP); à Conthey, 1 les 25 et 27.9 (jmGa); à Martigny-Combe, 1 le 4.10 et 1 le 9.10 (beP, eRe).

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

Le 4.10, 25 ind - max journalier pour l'automne - franchissent le col de Bretolet en une heure! (jGr); le même jour, 8 migrateurs passent sur Martigny-Combe (beP, eRe).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

1-2 ind semblent installer leurs quartiers hivernaux à Vouvry-Vionnaz, et ce dès la mi-octobre (nJ, liM, beP, eRe, rV).

FAUCON HOBREAU, BAUMFALKE

Abondance de données, en provenance de 12 localités. Premier le 5.9 à Martigny (beP), dernier le 19.10 à Vouvry (beP). A noter en montagne un migrateur le 6.9 au col de Tenneverge/Emosson, 2480 m (rA), un le 18.9 à Varneralp/Varen, 2200 m (rA), 4 le 19.9 au col de Balme/Trient (aSi) et un le 23.9 à Ulrichen (rA); en plaine 5 migrateurs le 4.10 sur Martigny-Combe (beP, eRe).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Un oiseau qui ravit en plein vol la proie d'un autre faucon, probablement hobereau, en se retournant et se plaçant sous ce dernier... Cette scène se joue à Grône, le 5.10 (mPe).

LAGOPÈDE, ALPENSCHNEEHUHN

Traces fraîches découvertes le 4.8 sur Täsch, à l'altitude de 3820 m (B. Badilatti).

CAILLE, WACHTEL

Toujours sur Täsch, rencontre totalement insolite le 17.8: une migratrice levée sur un glacier à l'altitude exceptionnelle de 3500 m (M. Baumann)!

RÂLE D'EAU, WASSERRALLE

Vu à Martigny le 3.9 (beP, eRe) et le 26.10 (beP) et à Sierre le 20.10 (Rey) et le 8.11 (mPe); entendu à Vionnaz les 24 et 28.10 (beP, eRe; aSi) et à Grône jusqu'au 21.11 (4 ind; jeF).

GRAND GRAVELOT, SANDREGENPFEIFER

Un le 15.9 à Martigny (cID, beP).

PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER

Un le 17.9 en escale sur la Crête de Thyon/Nendaz, 2400 m (aSi).

PLUVIER ARGENTÉ, KIEBITZREGENPFEIFER

Un oiseau à Vouvry le 15.8 (rV).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Un avant-coureur précoce, le 22.8 à Martigny (cID, beP), puis observé du 15.10 à Leuk (1 ind; Rey) au 29.11 à Martigny (beP); plus grand groupe signalé, celui de 37 ind le 15.11 à Vétroz (yCr).

BÉCASSEAU MINUTE, ZWERGSTRANDLÄUFER

1 ind les 15-16.9 à Martigny (cID, beP).

BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER

A Martigny le 6.10 (cID, beP).

BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHEPPE

Une à Vouvry le 8.11 (rV).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

A Vouvry, entendue le 19.10 (beP) et vue le 1.11 (cID, beP); suivent des isolées le 3.11 à Ardon (yCr), le 12.11 à Sierre (Rey), le 15.11 à Sion (yCr), le 19.11 à Collombey-Muraz et le 24.11 à Monthey (rV).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

1 ind le 17.9 à Trient (S. Triverio).

COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL

Vu le 8.10 à Collombey-Muraz (rV) et le 28.11 à Vouvry (eRe, rV).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

Observation élevée d'un ind le 23.7 à l'Arpille/Martigny-Combe, 1910 m (H. Wolczunowicz), puis, plus classique, un le 12.9 à Martigny (cID, beP).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Premier le 24.6 sur Collombey-Muraz, 1610 m (O. Turin)

et dernier les 12-13.9 à Visp (Ker; Sal). Entre ces 2 dates, peu d'observations, mais relevons en altitude les mentions de migrateurs isolés le 15.7 sur Grimentz, 2700 m (jCT) et le 9.8 à Nax, 2180 m (fE).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

2 le 9.8 à Martigny (beP), seule mention pour l'automne.

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Vu durant bien peu de temps, entre le 14.8 à Baltschieder (Ker) et le 3.9, jour où l'espèce est signalée à Martigny, Conthey, Grône (beP, eRe) et Sierre (Rey).

MOUETTE PYGMÉE, ZWERMÖWE

Une le 17.10 sur le lac au Bouveret (G. Gilliéron).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

2 le 23.6 à Conthey (paM) et une le lendemain à St-Maurice (eRe), sont à considérer comme un premier écho de la dissolution des colonies; suivent en juillet 8 ind le 2 à Leuk (Rey), puis 2 les 12-13 à Martigny (beP) et 2 le 16 à Grône (mPe). Aucune donnée en août, 2 en septembre, 6 en octobre et 4 en novembre; 2 dernières notées à Sierre le 21.11 (Rey).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

Une centaine d'ind les 28-29.11 à Vouvry-Vionnaz (eRe, rV; liM), très grand groupe pour le canton.

GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE

1 les 28-29.11 à Vouvry (eRe; liM).

GOÉLAND INDÉTERMINÉ, UNBEST. GROSSMÖWE

Un ind, très probablement leucopnée, le 4.8 à Ulrichen, 2390 m (D. Bianchi).

GOÉLAND LEUCOPNEE, WEISSKOPFMÖWE

Régulièrement observé à Vouvry-Collombey-Muraz depuis le 1.8 et jusqu'au 15.11(rV); max de 138 ind le 4.11 (rV). Plus à l'intérieur des Alpes, notons 5 ind le 11.7 au col du Lein/Vollèges, 1680 m (beP), et 4 groupes de 7 à 13 ind en migration vus à Martigny-Combe les 4, 9 et 11.10 (gCa, beP, eRe).

GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

Une à Grône du 5 au 7.9 (mPe, Rey, N. Udriot).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Seule observation hors col de Bretolet, 2 ind le 19.10 à Collombey-Muraz (beP, eRe).

PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE

Déjà un grand rassemblement d'environ 500 ind signalé à mi-août à Vouvry (rV). Par la suite, notons 800 ind le 19.10 à Collombey-Muraz (rV); le lendemain, 720 ind passent le col de Bretolet (jGr).

COUCOU, KUCKUCK

Un migrateur le 22.8 au Pas de Lona/St-Martin, 2780 m (Pra).

CHEVÉCHETTE, SPERLINGSKAUZ

Encore une famille les 2-3.10 sur Grône, 1880 m (jeF).

MARTINET NOIR, MAUERSEGLER

Passage se prolongeant en des dates inhabituellement tardives pour l'espèce: encore 9 observations en octobre; 2 derniers le 11 à Monthey (rV).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

En dehors des sites de nidification supposés, premiers signes de mouvements le 3.8 à Leuk (Rey), les 17 et 21.8 à Vernayaz et le 20.8 à Collombey-Muraz (jeF); au total, l'espèce sera vue en 13 localités durant l'automne.

HUPPE, WIEDEHOPF

Dernière le 12.9 à Icogne (aSi).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCH

Passage assez faiblement perçu: migratrices isolées signalées à Martigny les 6, 9 et 26.10 (beP), à Martigny-Combe le 9.10 et à Vouvry le 24.10 (beP, eRe); 2 dernières le 2.11 à Martigny (beP).

HIRONDELLE DE RIVAGE, Uferschwalbe

Dernière le 5.10 à Martigny (beP).

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSenschwalbe

Ultime observation le 5.11 à Brig-Glis (M. Kappeli).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUCHSCHWALBE

Encore 5 ind de 1^{re} année le 3.11 à Fully (P. Fellay par eRe).

PIPIT ROUSSELINE, BRACHPIEPER

2 ind capturés le 9.9 à Bretolet.

PIPIT À DOS OLIVE, WALDPIEPER

Un ind présentant les caractères de la ssp *A. h. yunnanaensis* capturé le 2.10 dans les filets du col de Bretolet (jGr, F. Nievergelt, et al; CAVS); pour cette espèce sibérienne, il s'agit là de la deuxième mention suisse ainsi que de la première mention dans les Alpes (NIEVERGELT et al 1999).

PIPIT DES ARBRES, BAUMPIEPER

Au col de Bretolet, dernier tardif le 12.10 (jGr).

PIPIT SPIONCELLE, BERGPIEPER

Fuyant les premières neiges, déjà vu en plaine le 14.9 à Martigny (cId, beP).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

Une attardée le 24.10 à Vouvry (beP).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Passage conséquent le 18.10 à Grône, où une centaine d'ind en migration répartis en groupes de 10 à 20 sont observés en une heure et demie (mPe). Par ailleurs, les groupes de 10 ind le 28.11 à Vouvry (eRe) et de 17 ind le 29.11 à Doréaz (beP, eRe) se préparent peut-être à passer l'hiver en nos contrées.

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Transhumance vers la plaine déjà perçue le 6.11 à Sion (aSi) et le 15.11 à Gampel (6 ind; Sal).

ROSSIGNOL, NACHTIGALL

Dernière mention le 28.9 à Grône (Rey).

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Capturée le 18.8 au col de Bretolet; sinon, une le 16.9 à Martigny, dans un champ de maïs... (beP).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

Migration apparemment retardée: encore un fort passage le 1.11 à Martigny, où bV compte un total de 53 ind; 10 ind le 15.11 entre Vouvry et Collombey-Muraz (eRe), puis isolés signalés jusqu'à la fin du mois à Collombey-Muraz, Collonges, Martigny et Conthey. En outre, ch entendu le 6.11 à Sion (aSi).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

Dernier le 24.10 à Martigny (beP).

TARIER, BRAUNKEHLCHEN

Un très attardé les 1-2.11 à Martigny (beP).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSMÄTZER

Apparaît en plaine seulement à partir de mi-septembre (le 14.9 à Martigny; beP); dernier extrêmement tardif, le 15.11 à Vouvry (beP, eRe).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

2 en plaine les 14-15.9 à Martigny (cId, beP) et encore un le 26.9 à Saas-Fee (cId).

MERLE À PLASTRON, RINGDROSSEL

Encore une dizaine le 20.10 à St-Luc, 2350 m, par des températures nettement inférieures à 0°C (jCT).

GRIVE LITORNE, WACHOLDERDROSSEL

50 le 25.11 sur St-Martin, 2200 m (J.-C. Praz).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

5 premières le 1.10 à Muraz (rV) et 3 dernières le 29.11 à Collonges (beP, eRe); à relever un groupe de 80 ind le 28.11 à Vouvry (rV).

LOCUSTELLE LUSCINOÏDE, ROHRSCHWIRL

Pour la 2^{ème} fois dans les filets au col de Bretolet, le 26.9.

PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSÄNGER

Vu à Martigny le 1.10 et le 19.10, date tardive (cId, beP).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER

Encore 6 ind le 6.10 à Martigny (beP).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE


Attardée le 5.10 à Martigny (beP).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

Une capture le 14.8 au col de Bretolet.

POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP

Mentionné dans la dernière décade de novembre à Sierre



L'Etourneau (Star) est une espèce faisant preuve d'une sociabilité très prononcée; c'est en automne que son esprit grégaire s'exprime avec le plus de force, quand des milliers d'individus se réunissent pour rechercher leur nourriture et pour dormir. — DESSIN JÉRÔME FOURNIER

(2 le 21; jeF), Vionnaz (4 le 22; nJ) et Martigny (1 le 29; beP, eRe).

POUILLOT FITIS, FITIS

8 ind "à la traîne" le 1.10 à Vouvry (rV).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER

Migration perçue du 30.7 à Aletsch, 1920 m (Y. Schaerer) au 6.10 à Martigny (beP).

MÉSANGE À LONGUE QUEUE, SCHWANZMEISE

Mouvements observés à mi-octobre à Bretolet, où plusieurs troupes totalisant un min de 30 ind franchissent le col le 15.10 (jGr).

MÉSANGE NONETTE, SUMPFMEISE

Près de 400 ind signalés le 28.10 aux Rigoles de Vionnaz (aSi).

TICHODROME, MAUERLÄUFER

Transhumance à basse altitude remarquée le 10.10 à Sion, 500 m (Gey), le 16.10 à St-Maurice, 500 m (jeF), le 8.11 à Bratsch, 650 m (Sal) et le 14.11 à Martigny, 460 m (beP).

GRIMPEREAU DES BOIS, WALDBAUMLÄUFER

Un trouvé mort au pied d'une baie vitrée le 15.11 à Martigny, 460 m (beP), bien loin de ses quartiers habituels des forêts subalpines.

RÉMIZ, BEUTELMEISE

A Grône, 2 le 29.7 déjà (Rey), 3 le 16.8 (mPe) et des cris le 3.9 (beP); à Martigny, 3 le 6.10, 2 le 26.10 et 2 le 2.11 (beP).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

En octobre, attardées le 1 à Martigny (beP) et les 6-8 à Collombey-Muraz (beP, eRe; rV).

PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER

Une les 18 et 26.10 à Turtmann (Rey).

CASSENOIX, TANNENHÄHER

Apparitions en plaine le 12.7 à Fully, le 9.8 et le 14.9 à Martigny, le 16.8 à Salgesch (beP) et dès le 13.8 à Monthey (rV). En altitude, 3 ind en vadrouille le 25.7 sur Zermatt, 4050 m (moJ, jS)!

CHOUCAS, DOHLE

Un min de 50 ind le 8.10 sur la ville de St-Maurice (paM).

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

Comme l'an dernier, quelques dizaines d'ind effectuent

quotidiennement le trajet val d'Illiez-Monthey, du 11.10 au 6.12 (rV). Sinon, une dizaine le 6.11 à Leuk (Rey) et 9 le lendemain à Dorénaz (jeF).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Mention la plus en aval, un ind le 8.11 à la gare de Sion (aSi).

ETOURNEAU, STAR

Au col de Bretolet, la première troupe migratrice est notée le 26.9 (jGr). Dans la série des chiffres impressionnants, rV compte 5000 ind le 5.10 à Monthey puis 8000 le lendemain! A fin novembre, encore 200 ind le 22 à Ardon (eRe) puis 15 ind le 29 à Dorénaz (beP, eRe).

MOINEAU DOMESTIQUE, HAUSSPERLING

Un "migrateur" le 24.10 à Berroi/Champéry, 1860 m (jGr).

NIVEROLLE, SCHNEESPERLING

Une grosse troupe de 100 ind le 2.8 sur Evolène (mTh).

PINSON DU NORD, BERGFINK

Premiers migrateurs observés au col de Bretolet le 2.10 (jGr); max de 80 ind le 4.11 entre Muraz et Vouvry (rV).

CHARDONNET, DISTELFINK

Un min de 150 ind le 27.9 à Collombey-Muraz (rV).

LINOTTE, HÄNFLING

Une centaine le 5.11 à Martigny (beP).

BRUANT JAUNE, GOLDAMMER

Au moins 50 ind le 15.10 à Vionnaz (rV).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

Unique mention automnale, 4 ind le 11.9 à Martigny (beP).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

2 le 22.10 à Vouvry (liM) et 1 le 5.11 à Martigny (beP).

ESPÈCES EXOTIQUES EXOTISCHE ARTEN

CALOPSITTE ÉLÉGANTE, NYMPHENSITTICH

Une le 25.4 dans la région du coude du Rhône/Martigny-Fully, puis une le 14.8 en vol sur la ville de Martigny (beP).

Erratum & Addendum

Indices de nidification 1987, 1989, 1990, 1992, 1993 et 1995

MARQUETTE POUSSIN, KLEINES SUMPFHUHN

Toutes les données relatives à la nidification de l'espèce doivent être rayées et attribuées en fait au Râle d'eau, des confusions des émissions vocales des 2 espèces ayant été commises (SIERRO, A., A. LUGON & E. WIDMANN 1999).

Automne 1996

Ajouter:

MOUETTE TRIDACTYLE, DREIZEHENMÖWE

Un ind de 1^{ère} année trouvé mort à début novembre à Nendaz, 1800 m; spécimen déposé dans une collection privée (S. Mariéthoz, P. Theytaz par aSi; CAVS); une des rares données pour l'espèce dans l'espace alpin.

Printemps-été 1997

MILAN ROYAL, ROTMILAN

La mention de juillet à Martigny est du 12.7 (rA) et non du 20-25.7.

CIRCAËTE, SCHLANGENADLER

La mention de Verbier est du 29.7 (rA) et non du 30.7.

Automne 1997

HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER

La mention de Martigny est du 12.7 (rA) et non du 20-25.7.

BIBLIOGRAPHIE

Complétée des publications récentes touchant à l'ornithologie valaisanne

- ARLETTAZ, R., J. FOURNIER & N. ZBINDEN. 2000. Evolution démographique (1979-1998) d'une population témoin de Huppe fasciée *Upupa epops* en Valais et stratégie de conservation ciblée. *Nos Oiseaux* 47: 19-27.
- NIEVERGELT, F., C. BERGER & J. GREMAUD. 1999. Zweiter Nachweis des Waldpiepers *Anthus hodgsoni* in der Schweiz. *Ornithol. Beob.* 96: 153-156.
- POSSE, B. 1999. Chronique ornithologique romande: le printemps et la nidification en 1997. *Nos Oiseaux* 46: 81-110.
- REVAZ, E. 1998. Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1996-1997 à l'automne 1997. *Bull. Murithienne* 116: 41-55.
- SIERRO, A. 1992. Les oiseaux de la réserve de Pouta-Fontana (Grône et Sierre, VS): situation en 1989 et 1990. *Bull. Murithienne* 110: 3-36.
- SIERRO, A., A. LUGON & E. WIDMANN. 1999. Confusion des émissions vocales de la Marouette poussin *Porzana parva* et du Râle d'eau *Rallus aquaticus*: nouvelle interprétation des données valaisannes en période de nidification. *Nos Oiseaux* 46: 111-112.
- WINKLER, R. 1999. Avifaune de Suisse. *Nos Oiseaux*, suppl.3.



